

En cas d'urgence

Trois minutes pour agir



PROTÉGER – ALERTER – SECOURIR

Gardez votre calme, protégez et rassurez le blessé, donner l'alerte et appelez les secours, prévenez le responsable de l'entreprise

18 Pompiers **112** Urgence Européenne **114** Numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes

L'ACCIDENT OU LE MALAISE NÉCESSITE L'INTERVENTION DES SECOURS

- Donner l'adresse de l'entreprise, sa localisation très précise ainsi que son numéro de téléphone
- Préciser le nombre de victimes, leur état apparent et la nature de l'accident
- **Attendre les instructions avant de raccrocher**
- En attendant les secours, couvrir le blessé, ne pas lui donner à boire
- Si possible, envoyer une personne à l'entrée de l'entreprise pour accueillir et guider les secours

LES SECOURS DEMANDENT QUE LA VICTIME SOIT AMENÉE PAR VOS SOINS À L'HOPITAL OU CHEZ LE MÉDECIN

- **Ne jamais se charger de transporter un malade ou un blessé, ni d'accompagner ou d'organiser ce transport quelle qu'en soit la destination** (hôpital, cabinet du médecin traitant ou domicile) par le véhicule de l'entreprise ou par la voiture d'un autre salarié
- Le transport du salarié se fera par un VSL ou un taxi

En cas de malaise


LA PERSONNE RÉPOND AUX QUESTIONS

- Ne pas déplacer la victime
- Mettre la victime au repos : allongée
- **Si la victime a des difficultés pour respirer, l'installer plutôt en position semi-assise**
- La couvrir
- Dans tous les cas, alerter le 15 et suivre les conseils du médecin



LA PERSONNE RESPIRE ET NE RÉPOND PAS AUX QUESTIONS

Installer la victime en position latérale de sécurité en attendant l'arrivée des secours extérieurs : PLS.



Si la victime n'a pas subi au préalable de traumatisme, dans ce cas la laisser sur le dos.

C'est un geste technique que seul un secouriste peut effectuer.

En cas d'arrêt cardiaque

1 Examen

- Apprécier l'état de conscience : poser des questions simples et demander d'exécuter des ordres simples. En l'absence de réponse, la victime a perdu connaissance
- Apprécier la respiration : basculer la tête en arrière, élever le menton afin de dégager la langue et laisser libre le passage de l'air. Regarder les mouvements respiratoires, écouter les sons et sentir le souffle durant 10 secondes.

2 Alerter

Un défibrillateur est disponible à proximité, le faire apporter



© SamiED

3 Pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire

- Se mettre à genoux contre la victime, sur le côté
- Positionner le talon d'une main au milieu de la poitrine. Placer l'autre main au-dessus de la première en veillant à relever les doigts
- Comprimer bras tendu à la verticale à raison de 30 compressions thoraciques en alternance avec 2 insufflations (bouche à bouche)

- Mettre en œuvre le plus tôt possible le défibrillateur, suivre les instructions délivrées par l'appareil



© SamiED

La formation aux gestes de secours (formation SST) reste indispensable pour la bonne réalisation de ces gestes.

La présence dans l'entreprise de personnel formé est une obligation réglementaire.

Votre service de formation STL Limousin

☎ 05 55 20 75 30

@ formation@stlim.org



spsti2387.fr

☎ 05 55 77 65 63

📍 6 rue Voltaire, CS 51223
87054 Limoges Cedex

@ contact@spsti23-87.fr

📘 spsti23-87

📷 spsti2387

En cas d'urgence

Trois minutes pour agir



PROTÉGER – ALERTE – SECOURIR

Gardez votre calme, protégez et rassurez le blessé, donner l'alerte et appelez les secours, prévenez le responsable de l'entreprise

18 Pompiers

112 Urgence Européenne


114 Numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes

En cas de membre sectionné

- 1 Couvrir la victime
- 2 Envelopper le segment sectionné dans une compresse
- 3 Placer le segment dans le kit de membre sectionné ou à défaut dans un sac plastique propre fermé de façon étanche qui sera mis dans un second sac plastique rempli de glaçon
- 4 Attention jamais de contact direct du membre sectionné avec de la glace

Membre sectionné enveloppé

Sac plastique intérieur



Sac plastique extérieur rempli de glace

En cas de saignement abondant

- 1 Allonger la victime
- 2 Comprimer la plaie avec un chiffon ou un vêtement propre ou avec un coussin hémostatique.
- 3 Maintenir la compression jusqu'à l'arrivée des secours

